

Indikatorer og standarder for Dansk Depressionsdatabase, januar 2025

Indikatorområde	Indikator	Type	Standard
Udredning 1. Vurdering ved speciallæge i psykiatri 2. Somatisk udredning	1a: Andelen af indlæggelser, der vurderes ved speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdato	Proces	1a: ≥ 90 %
	1b: Andelen af ambulante patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante kontakt	Proces	1b: ≥ 90 %
	2a: Andelen af indlæggelser, hvor der er iværksat somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdato	Proces	2a: ≥ 90 %
	2b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er iværksat somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante kontakt	Proces	2b: ≥ 60 %
Sociale støttebehov	3a: Andelen af indlæggelser hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse	Proces	3a: ≥ 90 %
	3b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant forløb	Proces	3b: ≥ 90 %
Sværhedsgrad af depression 4. Indlæggelsesstart 5. Udskrivning	4a: Andelen af indlæggelser, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage fra indlæggelsesdato	Proces	4a: ≥ 90 %
	4b: Andelen af ambulante patientforløb, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) senest 30 dage efter 1. ambulante kontakt	Proces	4b: ≥ 90 %
	4c: Andelen af ambulante forløb, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) mindst hver 12. uge under forløbet	Proces	4c: ≥ 90 %
	5a: Andelen af indlæggelser, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse	Proces	5a: ≥ 90 %
	5b: Andelen af ambulante patientforløb, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved afslutning af ambulant forløb	Proces	5b: ≥ 90 %
Selvmondsrisiko 6. Indlæggelse 7. Udskrivning	6a: Andelen af indlæggelser, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved indlæggelse	Proces	6a: ≥ 95 %
	6b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten er undersøgt for selvmordsrisiko i forbindelse med 1. ambulante kontakt	Proces	6b: ≥ 95 %
	7: Andelen af indlæggelser, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved udskrivelse	Proces	7: ≥ 95 %
Psykoteraeutisk behandling	8: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten er påbegyndt i psykoteraeutik senest 90 dage efter 1. ambulante kontakt	Proces	8: ≥ 60 %
Inddragelse af pårørende	9a: Andelen af indlæggelser, hvor der, senest ved udskrivning, er kommunikeret med pårørende med henblik på inddragelse	Proces	9a: 90 %
	9b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der, senest 90 dage efter 1. ambulante kontakt, er kommunikeret med pårørende med henblik på inddragelse	Proces	9b: 90 %
Planlagt opfølgning	10: Andelen af indlæggelser, hvor der er planlagt opfølgning senest ved udskrivelse	Proces	10: ≥ 90 %
Genindlæggelse	11: Andelen af indlæggelser, hvor patienten genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse	Resultat	11 ≤ 10 %
PRO-indikatorer (opgøres kun i Region Nordjylland)	13: Andelen af indlagte patienter, der opnår en forbedring i trivsel	Resultat	Afventer
	14: Andelen af indlagte patienter, der opnår en forbedring af fysisk helbred	Resultat	Afventer
	15: Andelen af indlagte patienter, der opnår en forbedring af psykisk helbred	Resultat	Afventer
	16: Andelen af indlagte patienter, der opnår en forbedring i forhold til at arbejde/uddanne sig	Resultat	Afventer
	17: Andelen af indlagte patienter, der opnår en forbedring i forhold til at kunne holde sit hjem	Resultat	Afventer
	18: Andelen af indlagte patienter, der opnår en forbedring i forhold til at gøre noget sammen med andre	Resultat	Afventer
	19: Andelen af indlagte patienter, der opnår en forbedring i forhold til at foretage sig noget alene	Resultat	Afventer
	20: Andelen af indlagte patienter, der opnår en forbedring i forhold til at indgå eller opretholde nære relationer	Resultat	Afventer