

Tjek-skema Dansk Depressionsdatabase (INDLAGTE)

[Indsæt patientlabel]

SKS-kode	Kodetekst
Indikator 1a. vurdering ved speciallæge i psykiatri indenfor 7 dage fra indlæggelsesdatoen:	
☐ ZZP0010C (dato_____)	Set og vurderet af speciallæge i psykiatri
☐ ZZP0010D (dato_____)	Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
☐ ZZV005B1 (dato_____)	Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri
Indikator 2a. iværksat initial somatisk udredning indenfor 2 dage fra indlæggelsesdatoen:	
☐ ZZ0149A (dato_____)	Somatisk undersøgelse
☐ ZZ0149AX (dato_____)	Somatisk udredning
☐ AWZ17+ ZZ0149A (dato_____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk undersøgelse
☐ AWZ17+ ZZ0149AX (dato_____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk udredning
Indikator 3a. Vurdering vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse:	
☐ ZZV005C (dato_____)	Vurdering vedrørende sociale støttebehov
☐ ZZ0150BX (dato_____)	Social udredning
☐ BVAW2 (dato_____)	Netværksmøde
☐ BVAW22 (dato_____)	Koordinerende netværksmøde
Indikator 4a. Vurdering af depressionssværhedsgraden ved HAM-D17 inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen:	
☐ ZZV020K (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
☐ ZZV020K1 (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse
+ VPH0000 – VPH0052	Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
☐ ZZV005B2 (dato_____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
Indikator 5a. Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-D17 ved udskrivelse	
☐ ZZV020K (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
☐ ZZV020K2 (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved afslutning/udskrivelse
+ VPH0000 – VPH0052	Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
☐ ZZV005B2 (dato_____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
Indikator 6a. selvmordsrisiko ved indlæggelse:	
☐ ZZ9970FA (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko
☐ ZZ9970FA1 (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko ved opstart/indlæggelse
Indikator 7. Selvmordsrisiko ved udskrivelse:	
☐ ZZ9970FA (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko
☐ ZZ9970FA2 (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko ved afslutning/udskrivelse
Indikator 8. Gælder IKKE for indlagte patienter	
Indikator 9a. tilbud om pårørendekontakt senest ved udskrivelse:	
☐ BVAA5 (dato_____)	Samtale med pårørende
☐ AWZ13B (dato_____)	Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig
☐ ZZV005B5 (dato_____)	Ingen indikation pårørendekontakt
Indikator 10. Planlagt opfølgning ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling:	
☐ AWB4 (dato_____)	Planlagt opfølgning
☐ ZZ0177A (dato_____)	Udarbejdelse af udskrivningsaftale
☐ ZZ0176A (dato_____)	Udarbejdelse af koordineringsplan
☐ ZZV005B4 (dato_____)	Ingen indikation for planlagt opfølgning

Tjekskemaet omfatter oplysninger i relation til indikatorsættet for Dansk Depressionsdatabase. Der skal udelukkende registreres med de ovenstående koder og dato, hvis den pågældende kliniske ydelse er udført eller værdi målt. Tjekskemaet er ikke et obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til depression og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til det Patient Administrative System/ Landspatientregistret. De kliniske ydelser dokumenteres desuden på sædvanlig vis i patientens journal.

Tjek-skema Dansk Depressionsdatabase (AMBULANTE)

[Indsæt patientlabel]

SKS-kode	Kodetekst
Indikator 1b. vurdering ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante kontakt:	
☐ ZZP0010C (dato_____)	Set og vurderet af speciallæge i psykiatri
☐ ZZP0010D (dato_____)	Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
☐ ZZV005B1(dato_____)	Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri
Indikator 2b. iværksat initial somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante kontakt:	
☐ ZZ0149A (dato_____)	Somatisk undersøgelse
☐ ZZ0149AX (dato_____)	Somatisk udredning
☐ AWZ17+ ZZ0149A (dato_____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk undersøgelse
☐ AWZ17+ ZZ0149AX (dato_____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk udredning
Indikator 3b. Vurdering vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulante kontakt:	
☐ ZZV005C (dato_____)	Vurdering vedrørende sociale støttebehov
☐ ZZ0150BX (dato_____)	Social udredning
☐ BVAW2 (dato_____)	Netværksmøde
☐ BVAW22 (dato_____)	Koordinerende netværksmøde
Indikator 4b. Vurdering af depressionssværhedsgraden ved HAM-D17 senest 30 dage efter 1. ambulante kontakt:	
☐ ZZV020K (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
☐ ZZV020K1 (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse
+ VPH0000 – VPH0052	Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
Indikator 4c. Andelen af ambulante forløb, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) mindst hver 12. uge under forløbet:	
☐ ZZV020K* (dato_____)	
☐ ZZV020K* (dato_____)	
☐ ZZV020K* (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
☐ ZZV020K* (dato_____)	
Evt. flere afhængigt af forløbets længde	
Indikator 5b. Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-D17 ved afslutning af ambulante kontakt:	
☐ ZZV020K (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
☐ ZZV020K2 (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved afslutning/udskrivelse
+ VPH0000 – VPH0052	Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
☐ ZZV005B2 (dato_____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
Indikator 6b. selvmordsrisiko ved 1. ambulante kontakt:	
☐ ZZ9970FA (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko
☐ ZZ9970FA1 (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko ved opstart/indlæggelse
Indikator 7. Gælder IKKE for ambulante patienter:	
Indikator 8. Tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante kontakt:	
☐ BRSP (dato_____)	Systematisk psykoterapi
☐ BRSP1 (dato_____)	Individuel psykoterapi
☐ BRSP5 (dato_____)	Psykoterapi i gruppe
☐ ZZV005B3 (dato_____)	Ingen indikation for tilbud om psykoterapi
Indikator 9b. tilbud om pårørendekontakt senest 90 dage efter 1. ambulante kontakt:	
☐ BVAA5 (dato_____)	Samtale med pårørende
☐ AWZ13B (dato_____)	Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig
☐ ZZV005B5 (dato_____)	Ingen indikation pårørendekontakt
Indikator 10. Gælder IKKE for ambulante patienter	
Indikator 11. Gælder IKKE for ambulante patienter	

Tjekskemaet omfatter oplysninger i relation til indikatorsættet for Dansk Depressionsdatabase. Der skal udelukkende registreres med de ovenstående koder og dato, hvis den pågældende kliniske ydelse er udført eller værdi målt. Tjekskemaet er ikke et obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til depression og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til det Patient Administrative System/ Landspatientregistret. De kliniske ydelser dokumenteres desuden på sædvanlig vis i patientens journal.